Yerba 501 FW

Yerba 501 FW

Atrazina
Herbicida agrícola / Solución acuosa

“COMPOSICIÓN PORCENTUAL”	**% en Peso**
INGREDIENTE ACTIVO	
Atrazina: 6-cloro-N2-etil-N4-isopropil-1,3,5-triazina-2,4-diamina	43%
(Equivalente a 480 g de i.a./L a 20°C)	
INGREDIENTES INERTES	
Diluyentes, humectantes y dispersantes	57%
Total	**100%**

Yerba 501 FW es un herbicida que tiene como ingrediente activo a la atrazina. La atrazina actúa de forma sistémica, absorbiéndose principalmente por raíces con translocación acrópeta vía xilema y con acumulación en meristemos. La atrazina tiene una absorción considerable por hoja.

Cultivo	Dosis L/Ha	Observación
Maíz	a) Cuando no hay rotación de cultivo 2.0 a 5.0	Aplicación pre o post-emergente al cultivo y en pre-emergencia a la maleza en caso de que predominen zacates se debe aumentar la dosis. También se puede utilizar en post-emergencia temprana a la maleza asegurándose de que esta sea menor a 5 cm y con predominancia de hoja ancha.
	b) Cuando el siguiente cultivo sea algodonero 2.0 a 2.5	Aplicación pre o post-emergente al cultivo y pre-emergencia a la maleza.
Soya	2.0 a 2.5	Aplique en pre-emergencia al cultivo y a la maleza, en suelo medianos con predominancia de hojas anchas. Se puede aplicar en post-emergencia al cultivo, cuando el sorgo tengas de 3 a 4 hojas.
Caña de azúcar	3.0 a 4.0	En suelos ligeros.

	4.0 a 5.0	En suelos medios y pesados. Trate sobre suelo húmedo antes de que emerja la maleza. **Yerba 501 FW** se puede aplicar en pre-emergencía o post-emergencía a la caña y siempre en pre-emergencía de la maleza.

MALEZA QUE CONTROLA:

NOMBRE COMÚN	**NOMBRE CIENTIFICO**
Blendo o quelite	Amaranthus sp.
Quelite cenizo	Chenopodium aibum
Cola de zorra	Setaría glauca
Bolsa de pastor	Capseila bursa-pastoris
Rosilla	Gallisoga parviliora
Pata de gallo	Eleusine indica
Verdolaga	Portulaca oleracea
Chililllo	Polygonum sp.
Rabanillo	Raphanus raphanistrum
Lechocilla, golondrina	Euphorbia sp.
Chipilin	Crotalaría sp.
Coralillo	Anagallis arvensis
Gigantón	Tithonia tubaeformis
Hierba mora	Solanum nigrum
Mala mujer, toloache	Datura stramonium
Malva	Malva sp.
Llanté	Plantago sp.
Anisilio	Fumaria officinalis
Acahual	Encelia mexicana

Tiempo de reentrada a las zonas tratadas: 12 Horas

MÉTODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO:

Para su preparación, **Yerba 501 FW** puede vaciarse en el tanque de mezclado o del equipo con agua a las ¾ partes del volumen requerido para lograr una buena cobertura para posteriormente agregar agua que falta. Es importante que exista suficiente agitación durante el mezclado y su aplicación para que la suspensión se mantenga uniforme.

Como la acción de este producto depende de la humedad en el suelo, es indispensable una lluvia o riego dentro de los 7 días posteriores a la aplicación.

a) Pre-emergencía

Aplique Yerba 501 FW en los días que siguen a la siembra, antes de que nazca la maleza y el cultivo. El suelo deberá estar bien molido y húmedo. La maleza emerge, se forman las primeras hojas, se amarillea y muere dentro de los 5 a 10 días posteriores a la aplicación.

b) Post-emergencía

Aplique **Yerba 501 FW** después de que brote la maleza, pero antes de que alcance los 5 cm de altura. El efecto se notará dentro de 10 a 15 días posteriores.

Yerba 501 FW puede ser aplicado con equipo terrestre motorizado o de mochila, no es corrosivo al equipo o superficies metálicas. Use agua limpia para evitar taponamientos.

CONTRAINDICACIONES:

En regiones con rotación de cultivos, no aplique más de 3 L/Ha de **Yerba 501 FW**, para evitar residuos en el suelo.

Los campos tratados con **Yerba 501 FW** no deben de sembrarse cultivos susceptibles hasta que haya transcurrido de 4 a 8 semanas.

Si las lluvias son abundantes, 6 meses después puede sembrarse algodón, papa, haba y trigo.

No deberá sembrarse alfalfa, tabaco y hortalizas hasta que haya transcurrido al menos un año. No aplique **Yerba 501 FW** donde se siembre cultivos asociados.

FITOTOXICIDAD:

Este producto no es fitotóxico en los cultivos y a las dosis aquí recomendadas.

INCOMPATIBILIDAD:

Este producto no ha presentado problemas de incompatibilidad cuando se mezcla con agroquímicos autorizados para su uso en los cultivos aquí mencionados, sin embargo, es recomendable realizar una premezcla para asegurarse de la compatibilidad física de los productos.

“MANEJO DE RESISTENCIA”

“Para prevenir el desarrollo de poblaciones resistentes, siempre respete la dosis y las frecuencias de aplicación evite el uso repetido de este producto, alternándolo con otros químicos de diferentes mecanismos destoxificación y mediante el apoyo de otros métodos de control”.

Distribuido por:
Técnica Agrícola Chiapas S.A. de C.V.
Central Poniente No 24
Tapachula, Chiapas 30700

www.tacsa.mx.