

	<b>SECCION I</b>	
	<b>FICHA TECNICA</b>	
	<b>AGROPA-25</b>	
	REGISTRO	HEDE-0244-008-013-025
	Fecha de elaboración:	10/04/09
	Fecha de actualización:	10/04/09
Páginas	1 de 3	

**PARAQUAT**  
**HERBICIDA AGRICOLA**  
**SOLUCION ACUOSA**

**COMPOSICION PORCENTUAL.**

Ingrediente activo: Sal de dicloruro de Paraquat  
 (ion de 1,1 dimetil 4,4 dipiridilo  
 en forma de cloruro de paraquat)

Concentración: Equivalente a 200 g de ac eq. / L .....no menos de 25%

Ingredientes Inertes:

Diluyente, humectante y estabilizantes .....no mas de 75%  
**TOTAL 100%**

Clase química: Bupiridilos

**Advertencia sobre riesgos:** AGROPA-25, es un producto moderadamente tóxico para humanos y animales domésticos, por lo que deberá evitar su ingestión, inhalación y contacto con la piel y ojos.

No se transporte ni almacene junto a productos alimenticios, ropa o forrajes, manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos, no almacenar en casas habitación, no deben exponerse ni manejar este producto las mujeres embarazadas, en lactación y personas menores de 18 años, no se reutilice el envase, destrúyase.

ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:** Lea cuidadosamente las instrucciones. Use el equipo de protección adecuado y completo necesario para realizar con seguridad las operaciones de manejo, preparación y aplicación del producto (gorra y overol de algodón, mascarilla contra vapores tóxicos, goggles o lentes de tipo químico, guantes y botas de neopreno). No coma, beba o fume durante la preparación y aplicación del producto. No aplique contra el viento.

Después de un día de trabajo, descontamine el equipo de protección y el equipo de aplicación (en el mismo campo tratado), lavándolos con detergente y una solución alcalina como lejía, báñese cuidadosamente y póngase ropa limpia.

**PRIMEROS AUXILIOS:** Si fuera ingerido el producto provoque inmediatamente el vómito. En caso de contacto del producto con la piel y ojos, lave inmediatamente las zonas expuestas con abundante agua por lo menos durante 15 minutos. En todos los casos lleve al paciente al médico.

<p><b>AgroFriends de México S.A de C.V.</b>  <b>AV. Vallarta No. 6503 Local 18oF</b>  <b>Ciudad Granja.</b>  <b>Zapopan, Jalisco. C.P. 45010 Tel:</b>  <b>31100136</b></p>	<p>En caso de intoxicación llame al servicio de <b>INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA (SINTOX)</b> orientación las 24 horas, los 365 días del año en los Tel. 5598-6659, 5611-2634, del interior lada sin costo 01-800-00928-00.</p>
--	--

	<b>SECCION I</b>	
	<b>FICHA TECNICA</b>	
	<b>AGROPA-25</b>	
	REGISTRO	HEDE-0244-008-013-025
	Fecha de elaboración:	10/04/09
	Fecha de actualización:	10/04/09
Páginas	2 de 3	

**TRATAMIENTO:** Provoque el vómito si éste no ha ocurrido y aplique lavado gástrico. Prepare den un litro de agua una solución con 70 g. de tierra de Fuller o Bentonita y 100 ml de glicerina y adicione un purgante como manitol 29%. Suministre tomas de 200 mls y repetir hasta detectar restos de absorbente en las heces fecales.

**MEDIDAS DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE:** No contamine con este producto agua corriente, depósitos o fuentes de agua. Después de realizar el triple lavado, maneje el envase vacío y sus residuos.

**Uso:** **AGROPA-25** es un herbicida agrícola desecante de contacto, no selectivo para el control de maleza de hoja ancha y zacates. **AGROPA-25**. No tiene efecto residual en el suelo y se inactiva al contacto con este. Se aplica en pre-emergencia al cultivo y postemergencia a la maleza.

**Modo de acción:** Actúa por contacto, dentro de los cloroplastos donde interrumpe la fotosíntesis y el flujo de electrones generando radicales libres fitotóxicos que desintegran el tejido célula.

CULTIVO	DOSIS L / ha.	EPOCA DE APLICACION
<b>Frutales y Perennes:</b> Papaya, guayabo, aguacate, manzano, peral, cítricos, durazno, nogal y alfalfa.	1.5 a 3.0	Maleza en crecimiento activo con una altura entre 5 y 15 cm.
<b>Cultivos en surco:</b> Papa, pepino, lechuga, melón, col, soya, sandía, jitomate, sorgo caña de azúcar, maíz, piña, cártamo, girasol, chícharo, cebolla, espárrago, frijol, brócoli, zanahoria, coliflor y calabacita. En estos cultivos se pueden hacer aplicaciones de presiembra o preemergencia. <b>AGROPA-25</b> se inactiva al contacto con el suelo y no afecta la emergencia de los cultivos.	1.5 a 2.0  1.5 a 3.	Maleza en crecimiento activo con una altura entre 5 y 15 cm.  Aplique en post-emergencia de la maleza en terreno preparado. En terrenos arenosos aplique 3 días antes de la emergencia del cultivo.
<b>DESECACION Y/O DEFOLIACION</b>		
Sorgo, trigo y cebada	1.5 a 2.0	Cuando el grano esté maduro y con humedad del 25 al 37%.

<b>AgroFriends de México S.A de C.V.</b> <b>AV. Vallarta No. 6503 Local 18oF</b> <b>Ciudad Granja.</b> <b>Zapopan, Jalisco. C.P. 45010 Tel:</b> <b>31100136</b>	<b>En caso de intoxicación llame al servicio de INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA (SINTOX) orientación las 24 horas, los 365 días del año en los Tel. 5598-6659, 5611-2634, del interior lada sin costo 01-800-00928-00.</b>
---	---

	<b>SECCION I</b>	
	<b>FICHA TECNICA</b>	
	<b>AGROPA-25</b>	
	REGISTRO	HEDE-0244-008-013-025
	Fecha de elaboración:	10/04/09
	Fecha de actualización:	10/04/09
Páginas	3 de 3	

Frijol y soya	0.5 a 1.5	Cuando el grano esté maduro.
Caña de azúcar	1.5 a 3.0	Desecación, queme y coseche de 4 a 7 días después de la aplicación.
Cártamo y girasol	1.5 a 3.0	Cuando el grano esté maduro.
Algodón ( 1 )	1.0 a 2.0	Cuando el 80 a 95% de las bellotas estén abiertas y el resto maduras.
Algodón ( 2 )	0.5	En combinación con un litro de defoliante fosforado, con 60 a 70% de bellotas abiertas y el resto maduras.
Areas no cultivadas	3.0 a 5.5	Instalaciones industriales, ferrocarriles, orillas de carretera y canales (con o sin herbicidas residuales)

## METODOS PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO:

**Aplicaciones Terrestres:** Mézclese la dosis de AGROPA-25 en la cantidad necesaria de agua limpia para cubrir una hectárea. La cantidad de AGROPA-25 y de agua variarán de acuerdo a la altura y cantidad de forraje de la maleza. Generalmente se usan 400-600 litros de agua limpia por ha tratada mezclando de 0.75 a 1.25 litros de AGROPA-25 en cada tambor de 200 litros de agua, asegurándose una buena cobertura de malezas.

**Aplicaciones Aéreas:** Aplíquese al amanecer o al atardecer. No aplicar cuando haya cultivos susceptibles a menos de 1 km. De distancia o cuando los vientos sean capaces de arrastrar la niebla de producto. Mézclese la cantidad requerida de AGROPA-25 con agua limpia en el tanque del aparato aplicador o depósito en la pista. En el avión ajústense las boquillas tirando atrás para obtener gotas de mayor tamaño.

<b>AgroFriends de México S.A de C.V.</b> <b>AV. Vallarta No. 6503 Local 18oF</b> <b>Ciudad Granja.</b> <b>Zapopan, Jalisco. C.P. 45010 Tel:</b> <b>31100136</b>	<b>En caso de intoxicación llame al servicio de INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA (SINTOX) orientación las 24 horas, los 365 días del año en los Tel. 5598-6659, 5611-2634, del interior lada sin costo 01-800-00928-00.</b>
---	---