



TacsPen Ultra

Coadyuvante

“COMPOSICIÓN PORCENTUAL”**%en Peso****INGREDIENTE ACTIVO**

Mezcla de agentes tensoactivos	29.90%
	2.30%

INGREDIENTES INERTES

Dioctil sulfo succinato	
Acondicionadores y diluyentes	67.80

Total**100%**

TacsPen Ultra es un penetrante, adherente, dispersante y antiespumante que permite obtener mayor eficacia en el uso de los agroquímicos de acción neutra ya que no presenta problemas de compatibilidad.

MÉTODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO

Tratamiento foliar en mezcla con	Dosis de TacsPen Ultra
Fungicidas, herbicidas, insecticidas, defoliantes, desecantes, fitoreguladores y fertilizantes foliares.	Incorporar a la mezcla 1 cc. Por litro de agua a utilizar, si los cultivos cuentan con hojas muy cerosas o con vellosidades, incorporar el doble de la dosis anterior.
Para tratamientos a semillas de arroz, avena, cebada y sorgo escobero o en mezcla con los agroquímicos de uso común.	Incorporar a la mezcla de 2 a 3 cc. Por litro de agua.
Para tratamiento de tubérculos y enraizamiento de estacas.	Incorporar a la mezcla para inmersión 1cc. Por litro de agua.

FITOTOXICIDAD

TacsPen Ultra, en la forma de uso y dosis recomendadas en esta etiqueta, no a presentado fitotoxicidad en los cultivos.

INCOMPATIBILIDAD

TacsPen Ultra, no presenta incompatibilidad en mezcla con los agroquímicos conocidos.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

Si para la aplicación del producto es necesario mezclarlo con productos plaguicidas, se sugiere utilizar equipo de protección durante la preparación de la mezcla, carga del equipo y aplicación de los mismos, de acuerdo a las indicaciones del plaguicida usado.

PRIMEROS AUXILIOS:

Retire a la persona intoxicada del área contaminada para evitar mayor contacto, recuéstela en un lugar fresco y bien ventilado, cámbiele de ropa, manténgala abrigada y en reposo. Si ha habido contacto con la piel u ojos, lávese la parte afectada con abundante agua corriente limpia. Si ha ingerido el producto y la persona está consciente, provoque el vómito introduciendo un dedo en la garganta o administrando agua tibia salada. Si la persona está inconsciente, asegúrese que pueda respirar sin dificultad, no provoque el vómito y no trate de introducir absolutamente nada en la boca.