

PARTE CENTRAL DE ETIQUETA
"USO AGRICOLA"

LOGO YERBA

Yerba 501 FW
atrazina
Herbicida agrícola
Suspensión acuosa

"COMPOSICION PORCENTUAL"

INGREDIENTE ACTIVO:

atrazina: 6-Cloro-N2-etil-N4-isopropil-1,3,5-triazina-
2,4-diamina
(Equivalente a 480 g de i.a./L a 20°C)

% EN PESO

43

INGREDIENTES INERTES:

Diluyentes, humectantes y dispersantes

57
100

T O T A L

REG.: ~~HEDE-0204-320-008-041~~

CONTENIDO NETO:



NOCIVO SI SE INHALA

No. LOTE:

FECHA DE FABRICACION:

FECHA DE CADUCIDAD: 2 años a partir de la fecha de fabricación.

TITULAR DEL REGISTRO:

CENTRO AGROINDUSTRIAL MEXIQUENSE SA DE CV
Sor Juana Inés de la Cruz 305 Norte
Toluca, Edo. De México
50000 Tel: (722)2142259

DISTRIBUIDOR:

TACSA
Central Poniente No. 24
Tapachula, Chiapas
Tel: (962)6289900

"HECHO EN ESTADOS UNIDOS DE AMERICA"

" "ENVASADO EN MEXICO"

PRECAUCION

Banda toxicológica color Azul

LADO DERECHO DE ETIQUETA
“USESE EXCLUSIVAMENTE EN LOS CULTIVOS Y MALEZA AQUI RECOMENDADOS”

“INSTRUCCIONES DE USO”
“¡SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACION!”

CARACTERISTICAS:

YERBA 501 FW se aplica diluido en agua. Este herbicida es absorbido por las raíces y las hojas de la maleza de hoja ancha y zacates. No controla maleza perenne establecida (zacate Johnson y coquillo).

RECOMENDACIONES:

Las dosis más bajas se aplican en suelos ligeros (franco-arenosos) y las más altas en suelos pesados (arcillosos) o ricos en materia orgánica.

CULTIVO	DOSIS L/Ha	OBSERVACIONES
Maíz	a) Cuando no hay rotación de cultivo. 2.0 a 5.0	Aplicación pre o post-emergente al cultivo y en pre-emergencia a la maleza. En caso de que predominen zacates se debe aumentar la dosis. También se puede utilizar en post-emergencia temprana a la maleza asegurándose de que esta sea menor de 5 cm y con predominancia de hojas anchas.
	b) Cuando el siguiente cultivo sea algodón 2.0 a 2.5	Aplicación pre o post-emergente al cultivo y pre-emergente a la maleza.
Sorgo	2.0 a 2.5	Aplicar en pre-emergencia al cultivo y a la maleza, en suelos medianos con predominancia de hojas anchas. Se puede aplicar en post-emergencia al cultivo, cuando el sorgo tenga de 3 a 4 hojas.
Caña de azúcar	3.0 a 4.0 4.0 a 5.0	En suelos ligeros. En suelos medios y pesados. Trate sobre el suelo húmedo antes de que emerja la maleza. Yerba 501 FW se puede aplicar en pre-emergencia o post-emergencia a la caña y siempre en pre-emergencia de la maleza.

MALEZA QUE CONTROLA:

NOMBRE COMUN	NOMBRE CIENTIFICO
Bledo o quelite	<i>Amaranthus sp.</i>
Quelite cenizo	<i>Chenopodium album</i>
Cola de zorra	<i>Setaria glauca</i>
Bolsa de pastor	<i>Capsella bursa-pastoris</i>
Rosilla	<i>Gallinsoga parviflora</i>
Pata de gallo	<i>Eleusine indica</i>
Verdolaga	<i>Portulaca oleracea</i>
Chilillo	<i>Polygonum sp.</i>
Rabanillo	<i>Raphanus raphanistrum</i>
Lechocilla, golondrina	<i>Euphorbia sp.</i>
Chipilín	<i>Crotalaria sp.</i>
Coralillo	<i>Anagallis arvensis</i>
Gigantón	<i>Tithonia tubaeformis</i>
Hierba mora	<i>Solanum nigrum</i>
Mala mujer, toloache	<i>Datura stramonium</i>
Malva	<i>Malva sp.</i>
Llanté	<i>Plantago sp.</i>
Anisillo	<i>Fumaria officinalis</i>
Achual	<i>Encelia mexicana</i>

CONTINUACIÓN LADO DERECHO DE ETIQUETA

TIEMPO DE REENTRADA A LAS ZONAS TRATADAS: 12 Horas.

METODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO:

Para su preparación, **Yerba 501 FW** puede vaciarse en el tanque de mezclado o del equipo con agua a las 3/4 partes del volumen requerido para lograr una buena cobertura, para posteriormente agregar el agua que falta. Es importante que exista suficiente agitación durante el mezclado y su aplicación para que la suspensión se mantenga uniforme.

Como la acción de este producto depende de la humedad en el suelo, es indispensable una lluvia o riego dentro de los 7 días posteriores a la aplicación.

A) Pre-emergencia:

Aplique **Yerba 501 FW** en los días que siguen a la siembra, antes de que nazca la maleza y el cultivo. El suelo deberá estar bien mullido y húmedo. La maleza emerge, se forman las primeras hojas, se amarillea y muere dentro de los 5 A 10 días posteriores a la aplicación.

B) Post-emergencia:

Aplique **Yerba 501 FW** después de que brote la maleza, pero antes de que alcance los 5 cm de altura. El efecto se notará dentro de los 10 a 15 días posteriores.

Yerba 501 FW puede ser aplicado con equipo terrestre motorizado o de mochila, no es corrosivo al equipo o superficies metálicas. Use agua limpia para evitar taponamientos.

CONTRAINDICACIONES:

En regiones con rotación de cultivos, no aplique más de 3 L/Ha de **Yerba 501 FW**, para evitar residuos en el suelo.

Los campos tratados con **Yerba 501 FW** no deben sembrarse con cultivos susceptibles hasta que hayan transcurrido de 4 a 6 semanas.

Si las lluvias son abundantes, 6 meses después puede sembrarse algodón, papa, haba y trigo.

No deberá sembrarse alfalfa, tabaco y hortalizas hasta que haya transcurrido al menos un año. No aplique **Yerba 501 FW** donde se siembren cultivos asociados.

FITOTOXICIDAD:

Este producto no es fitotóxico en los cultivos y a las dosis aquí recomendados.

INCOMPATIBILIDAD:

Este producto no ha presentado problemas de incompatibilidad cuando se mezcla con agroquímicos autorizados para su uso en los cultivos aquí mencionados. Sin embargo, es recomendable realizar una premezcla para asegurarse de la compatibilidad física de los productos.

“MANEJO DE RESISTENCIA”

“PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE POBLACIONES RESISTENTES, SIEMPRE RESPETE LA DOSIS Y LAS FRECUENCIAS DE APLICACIÓN; EVITE EL USO REPETIDO DE ESTE PRODUCTO, ALTERNÁNDOLO CON OTROS GRUPOS QUÍMICOS DE DIFERENTES MODOS DE ACCIÓN Y DIFERENTES MECANISMOS DE DESTOXIFICACIÓN Y MEDIANTE EL APOYO DE OTROS MÉTODOS DE CONTROL”.

PRECAUCION

Banda toxicológica color Azul

LADO IZQUIERDO DE ETIQUETA
“¡ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO!”

“PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO”

Lea cuidadosamente la etiqueta. Los aplicadores y personas que manejan el producto deben usar el equipo de protección adecuado necesario para realizar con seguridad las actividades de manejo, preparación y aplicación del producto (mascarilla contra polvos o neblinas, lentes industriales o careta, guantes de nitrilo, overol y botas de hule).

“PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO”

- “NO COMA, BEBA O FUME CUANDO ESTÉ UTILIZANDO ESTE PRODUCTO.”
- “NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ROPA O FORRAJES.”
- “MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, MUJERES EMBARAZADAS, EN LACTANCIA Y ANIMALES DOMÉSTICOS.”
- “LÁVESE LAS MANOS DESPUÉS DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y ANTES DE CONSUMIR ALIMENTOS.”
- “NO ALMACENE EN CASAS HABITACIÓN.”
- “NO USE EL PRODUCTO SIN EL EQUIPO DE PROTECCIÓN ADECUADO.”
- “LOS MENORES DE 18 AÑOS NO DEBEN MANEJAR ESTE PRODUCTO.”
- “AL FINAL DE LA JORNADA DE TRABAJO BÁÑESE Y PÓNGASE ROPA LIMPIA.”
- “NO SE INGIERA, INHALE Y EVÍTESE EL CONTACTO CON LOS OJOS Y PIEL.”
- “NO MEZCLE O PREPARE EL PRODUCTO CON LAS MANOS, USE GUANTES, USE UN TROZO DE MADERA U OTRO MATERIAL APROPIADO.”
- “NO DESTAPE LA BOQUILLA CON LA BOCA.”

“EN CASO DE INTOXICACIÓN LLEVE AL PACIENTE CON EL MÉDICO Y MUÉSTRELE ESTA ETIQUETA”

“PRIMEROS AUXILIOS”

- Retire a la persona intoxicada de la fuente de contaminación, para evitar mayor contacto.
- Consiga atención médica de inmediato y muéstrele la etiqueta al médico.
- Mantenga al paciente abrigado y en reposo.
- Si ha habido alguna salpicadura en los ojos, lávelos por lo menos durante 15 minutos con agua limpia.
- Si hubo derrame sobre la piel, lave cuidadosamente con agua y jabón y quite la ropa contaminada a la persona intoxicada.
- Si ha ingerido el producto, no provoque el vómito, consiga un médico inmediatamente y muéstrele esta etiqueta.
- Si la persona está inconsciente, asegúrese de que pueda respirar sin dificultad, no provoque el vómito y no trate de introducir absolutamente nada en la boca.

“RECOMENDACIONES AL MEDICO”. Para mayor información en caso de intoxicación llame a:

TELEFONOS DE EMERGENCIA SINTOX
Lada sin costo 01 800 00 92800
01(55) 5598- 6659/ 5611-2634
SERVICIO GRATUITO LAS 24 HRS./365 DIAS DEL AÑO

GRUPO QUIMICO: Triazinas.

SINTOMAS DE INTOXICACION: No se conocen casos de intoxicación en humanos. En caso de ingerirse o de inhalarse puede presentarse dolor de cabeza, diarrea o vómito, irritación en los ojos y/o reacciones alérgicas en personas sensibles.

ANTIDOTO Y TRATAMIENTO ESPECIFICO:

No existe antídoto específico. En el caso de intoxicación, el tratamiento recomendado es sintomático.

CONTINUACION LADO IZQUIERDO DE LA ETIQUETA

“MEDIDAS PARA PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE”

- “DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO, EVITE LA CONTAMINACIÓN DE SUELOS, RÍOS, LAGUNAS, ARROYOS, PRESAS CANALES O DEPÓSITOS DE AGUA, NO LAVANDO O VERTIENDO RESIDUOS DE PLAGUICIDAS O ENVASES VACIOS”.
- “MANEJE EL ENVASE VACIO Y LOS RESIDUOS DE PRODUCTO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS, SU REGLAMENTO O AL PLAN DE MANEJO DE ENVASES VACIOS DE PLAGUICIDAS, REGISTRADO ANTE LA SEMARNAT”.
- “EL USO INADECUADO DE ESTE PRODUCTO PUEDE CONTAMINAR EL AGUA SUBTERRÁNEA. EVITE MANEJARLO CERCA DE POZOS DE AGUA Y NO LO APLIQUE EN DONDE EL NIVEL DE LOS MANTOS ACUÍFEROS SEA POCO PROFUNDO (75 CM DE PROFUNDIDAD) Y LOS SUELOS SEAN MUY PERMEABLES (ARENOSOS)”.
- “EN CASO DE DERRAMES SE DEBERÁ USAR EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL Y RECUPERAR EL PRODUCTO DERRAMADO CON ALGÚN MATERIAL ABSORBENTE (POR EJEMPLO TIERRA O ARCILLA), COLECTAR LOS DESECHOS EN UN RECIPIENTE HERMÉTICO Y LLEVARLO AL CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS PELIGROSOS AUTORIZADO MÁS CERCANO”.
- “REALICE EL TRIPLE LAVADO DEL ENVASE VACIO Y VIERTA EL AGUA DE ENJUAGUE EN EL DEPÓSITO O CONTENEDOR DONDE PREPARE LA MEZCLA PARA APLICACIÓN”.

“ESTE PRODUCTO ES ALTAMENTE TÓXICO PARA ANIMALES (PECES, INVERTEBRADOS ACUÁTICOS) Y EXTREMADAMENTE TÓXICO PARA PLANTAS ACUÁTICAS (ALGAS Y PLANTAS VASCULARES)”.

GARANTIA:

CAMSA garantiza que el producto es apto para los fines recomendados por la empresa, por lo que se obliga a cubrir al consumidor los gastos razonablemente erogados y a reemplazar el producto defectuoso en el domicilio indicado en la etiqueta, siempre y cuando éste haya sido adquirido en su envase original, protegido por el sello de garantía y dentro del período de caducidad del mismo.

No aplica cuando la efectividad del mismo haya sido influenciada por condiciones climáticas y del suelo, resistencia, técnica de aspersión, se haya utilizado en especies diferentes a las indicadas o por el uso de un método de aplicación distinto al sugerido en las instrucciones. Por lo que no asume responsabilidad alguna por daños o accidentes ocasionados durante su transporte, almacenamiento, manejo, aplicación inadecuada, así como la desviación e interpretación errónea de las instrucciones de uso.

Al preparar o mezclar



Después de aplicar



PRECAUCION

Banda toxicológica color Azul