



## TacsaNato

Glufosinato de amonio  
Herbicida / Concentrado soluble

### “COMPOSICIÓN PORCENTUAL” % en Peso

#### INGREDIENTE ACTIVO

**Glufosinato de amonio:** Ácido de amonio (2RS)-  
2-amino-4-(metilfosfinato)butírico 18.4 %  
(Equivalente a 200 g de ingrediente activo / L a 20°C)

#### INGREDIENTES INERTES

Humectante, agente neutralizante y solvente. 81.6 %

---

Total 100.0 %

**TacsaNato** es un herbicida formulado como concentrado soluble, para uso en los cultivos abajo mencionados y para el control de las enfermedades que a continuación se mencionan:

CULTIVO	PLAGA	DOSIS (L/ Ha)	OBSERVACIONES
Maíz (SL)	Coquillo ( <i>Cyperus rotundus</i> ) Lechosa ( <i>Euphorbia heterophylla</i> ) Flor amarilla ( <i>Baltimora recta</i> ) Tomatillo ( <i>Physalis angulata</i> ) Zacate de agua ( <i>Echinochloa colonum</i> )	1.125- 1.5 L/Ha	Realizar una aplicación foliar en post-emergencia dirigida a la maleza, cuando ésta se encuentre en crecimiento activo no mayor a 15 cm de altura, volumen de aplicación 150-250 L/Ha.
Sorgo (SL)			

Tiempo de reentrada a campos tratados: 24 horas.

( ) Intervalo de seguridad en días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.

SL: Sin Límite

#### MÉTODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO

Para abrir el envase, quite la tapa de rosca girando en sentido contrario a las manecillas del reloj y retire el sello de seguridad, abra el frasco y utilice. Llene el tanque a la mitad de su capacidad con agua limpia. En forma separada prepare una pre-mezcla con poca agua y la dosis a emplear de **TacsaNato**. Una vez que el líquido se diluya por completo, vierta esta pre-mezcla al tanque y complete con agua sin dejar de agitar. Use el equipo de protección como lo indica la sección de “Precauciones y Advertencias de Uso” de esta etiqueta.

**CONTRAINDICACIONES**

No aplicar en horas de calor intenso ni con vientos mayores de 15 km/h, o cuando se pronostique lluvia próxima.

**FITOTOXICIDAD**

**TacsaNato** no es fitotóxico a los cultivos aquí indicados si se utiliza de acuerdo a las dosis y recomendaciones de esta etiqueta.

**INCOMPATIBILIDAD**

**TacsaNato** este producto es compatible con otros plaguicidas como Oxifluorfen 240 g/L EC y Pendimetalina 500 g/L EC.

Presentación única 1 l.

**Categoría Toxicológica IV (Banda azul)**

Registro único del producto: RSCO-HEDE-0231-X0149-375-18.4

Distribuido por:

Técnica Agrícola Chiapas SA de CV  
Central Poniente No 24  
Tapachula, Chiapas 30700  
[www.tacsa.mx](http://www.tacsa.mx)